

Sincrogest Inyectable

Uso Veterinario

Progesterona Inyectable

Reg.: SAGARPA Q-7750-092

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Progesterona 15,00 g
Vehículo c.s.p. 100,00 mL

Indicaciones:

La Progesterona es una hormona esteroide y determina la duración del ciclo estral por medio del bloqueo de la secreción de la hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH) en el hipotálamo y consecuentemente de LH y la ovulación.

Sincrogest Inyectable posee amplia utilización en medicina veterinaria cuando es necesario reproducir el efecto de progestágenos naturales. Es indicado para hembras bovinas en la sincronización de onda folicular en la utilización en conjunto con estrógenos. Tal asociación determina la atresia de folículos y emergencia de una nueva onda folicular.

Sincrogest Inyectable también es indicado para la inducción de lactancia de hembras bovinas,

cuando utilizado en protocolos farmacológicos para esta finalidad.

Modo de Uso y Dosis:

Para la sincronización de onda folicular en la utilización en conjunto con estrógenos, aplicar **Sincrogest Inyectable** por la vía intramuscular profunda en la dosis de 1,0 mL (150 mg de Progesterona) en dosis única. Para la inducción de lactancia, cuando utilizado en protocolos farmacológicos para esta finalidad, aplicar **Sincrogest Inyectable** por la vía intramuscular profunda en la dosis de 2,0 mL (300 mg de Progesterona) en dosis única, de acuerdo al protocolo propuesto por el médico veterinario.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No aplicar en animales jóvenes, sexualmente inmaduros.
No utilizar el producto con el plazo de caducidad vencido.

No utilizar en animales que presenten hipersensibilidad conocida a cualquier uno de los componentes del producto.

Precauciones:

Obedecer al modo de aplicación del producto.

Utilizar agujas y jeringas esterilizadas, observando las buenas prácticas de asepsia. La respuesta a los tratamientos hormonales depende del buen estado corporal (nutricional y de sanidad) en que el animal se encuentra y de la ausencia de disturbios fisiológicos, reproductivos y hormonales.

Interacciones medicamentosas:

El metabolismo de las progestinas, entre ellas la Progesterona, puede aumentar cuando administradas juntamente con la rifampicina, visto que este es un potente inductor de las enzimas del citocromo P450 presentes en el hígado.

Reacciones adversas:

El producto no provoca reacciones adversas se utilizado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No son esperadas reacciones de hipersensibilidad en animales con el uso del producto, sin embargo reacciones individuales

de hipersensibilidad pueden ocurrir en animales susceptibles.

Tiempo de Retiro:

No hay tiempo de retiro para la carne de los animales tratados. No hay tiempo de retiro para la leche de los animales tratados.

Conservar el producto en su embalaje original, en local seco y fresco, entre 15°C y 30°C, protegido de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Su venta requiere receta médica cuantificada. Para uso exclusivo del médico veterinario.

Responsable Técnica:

Dra. Sandra Barioni Toma -
CRMV/SP 14.817



Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil

Importado y distribuido por:

OURO FINO DE MÉXICO S.A. DE C.V.
AV. GUADALUPE, #5134 INT. B,
COLONIA JARDINES DE
GUADALUPE - ZAPOPAN, JALISCO,
MÉXICO CP. 45030
Tel: 01 33 3620 3812
ourofino@prodigy.net.mx