

Isocox

— Uso Veterinario

Agente anticoccidial para bovinos, ovinos y porcinos

Fórmula:

Cada 100 mL de producto contiene:
Toltrazuril 5,00 g
Vehículo c.s.p 100,00 mL

Indicaciones:

Isocox es un agente anticoccidial para porcinos, bovinos y ovinos.

Porcinos: La coccidiosis causa diarrea principalmente en lechones con edad entre 5 a 30 días. **Isocox** actúa en todas las fases de desarrollo del parásito y está indicado para metafílaxis y tratamiento de la coccidiosis (isosporiasis porcina).

Bovinos y ovinos: La coccidiosis bovina y ovina acomete principalmente animales jóvenes, también presentando alteraciones gastrointestinales y cuadros variables de diarrea. En estas especies, el **Isocox** está indicado en la metafílaxis y tratamiento de la coccidiosis bovina provocada por *Eimeria bovis* y *Eimeria zuernii* y ovina por *Eimeria crandallis* y *Eimeria ovinoidalis*.

Modo de Uso y Dosis:

Porcinos: **Isocox** debe ser administrado a toda lechigada a partir del tercer día de vida como metafílaxis de la coccidiosis en la siguiente dosis: 20 mg/kg de peso (equivalente a 1 mL de **Isocox** para cada lechón). Para tratamiento, utilizar la dosis de 20 mg/kg de peso (equivalente a 1 mL de **Isocox** para cada 2,5 kg de peso de los animales). En caso de propiedades con alto desafío, la dosis puede ser repetida tras 5 días o a criterio del médico veterinario.

Bovinos y ovinos: debe ser administrado en bovinos en la dosis de 15 mg/kg de Toltrazuril (equivalente a 3 mL/10 kg de peso vivo) por la vía oral en dosis única. En ovinos, administrar en la dosis de 20 mg/kg de Toltrazuril (equivalente a 1 mL/2,5 kg de peso vivo) por la vía oral en dosis única.

Instrucciones para administración:

Frascos de 100 mL: Para montar el frasco dosificador, retirar el sello de seguridad, atascar el aplicador y agitar el frasco. Girar la válvula del aplicador hacia indicado y presionarlo varias veces hasta el producto aparecer en la parte superior del pico regulador. Después, realizar la contención adecuada del animal e insertar el pico regulador en su boca. Presionar la válvula del aplicador hasta el fin. Cada rociado (movimiento de la válvula) administra 1 mL de producto.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

El aplicador es destinado para facilitar la administración de pequeños volúmenes de **Isocox**, de manera que el producto puede ser utilizado con la ayuda de jeringa o pistola reguladora adecuada, de acuerdo con el peso de los animales a ser tratados, respetándose la dosis indicada para cada especie.

Frascos de 250 mL y 1 L: Retirar el sello de seguridad y agitar el frasco. Con jeringa o pistola reguladora adecuada y ante la contención del animal, aplicar el producto por la vía oral.

Precauciones:

Agitar bien el frasco antes de usar. Obedecer las dosis recomendadas para uso del producto. Solamente el médico veterinario puede hacer alteraciones en las dosis del producto. No utilizar el producto con plazo de caducidad vencido.

Tiempo de Retiro:

Bovinos:

Carne: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 63 días después de finalizado el tratamiento.

Leche: Este producto no debe ser aplicado en hembras productoras de leche para consumo humano.

Ovinos:

Carne: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 67 días después de finalizado el tratamiento.

Leche: Este producto no debe ser aplicado en hembras productoras de leche para consumo humano.

Porcinos:

Carne: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 77 días después de finalizado el tratamiento.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No hay. El Toltrazuril puede ser asociado a suplementos de hierro para lechones bien como antibióticos como enrofloxacin, gentamicina, sulfa y colistina.

Reacciones adversas:

Puede ocurrir vómito. Caso ocurra, administrar de nuevo.

Consulte al médico veterinario.

Venta bajo prescripción del médico veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Conservar en local seco y fresco, en temperatura entre 15°C y 30°C, protegido de la luz solar intensa. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Importado y distribuido por:

México: Reg. Q-7750-079

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/ Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Hecho en Brasil