

Meloxifin 0,2% Solución Inyectable

Uso Veterinario

Antiinflamatorio no esteroide.

Acción antiinflamatoria más potente y duradera,
sin complicaciones gástricas.

Fórmula:

Cada 100 mL contienen:

Meloxicam 0,200 g

Vehículo c.b.p. 100,0 mL

Indicaciones:

Meloxifin 0,2% es un antiinflamatorio no esteroide con actividad inhibitoria selectiva de la cicloxigenasa-2 (COX-2), que confiere un doble beneficio terapéutico, resultando en excelente actividad antiinflamatoria, analgésica y antiexsudativa con mínimos efectos gastrolesivos o ulcerogénicos. Además de esos efectos, Meloxicam inhibe aunque la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado y previene la destrucción ósea y cartilaginosa que ocurre en los procesos de inflamación degenerativa del sistema

locomotor.

Meloxifin 0,2% es indicado en procesos inflamatorios de perros, tales como:

- Patologías dolorosas o degenerativas, agudas o crónicas, del sistema osteomioarticular: osteítis, artritis, artritis reumatoides, osteoartritis, espondilosis, espondiloartrosis anquilosantes, displasias coxofemorales, calcificación de discos intervertebrales, reparación de fracturas, traumatismos y postoperatorio de artroplastias.
- Afecciones oculares: uveítis, conjuntivitis, postoperatorios.
- Desordenes de orden reproductiva como retención de placenta.
- Metritis y mastitis.
- Analgesia pre y postoperatoria.

Modo de Uso y Dosis:

Dosis para Perros

| | |
|--|--|
| Primer día de tratamiento | 1,0 mL para cada 10 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam por kg de peso corporal) |
| Segundo día de tratamiento en adelante | 0,5 mL para cada 10 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal) |

Meloxifin 0,2% debe ser administrado una vez al día, o a cada 24 horas por las vías subcutánea, intramuscular o intravenosa.

Duración del tratamiento:

La duración del tratamiento deberá ser estipulada de acuerdo con la gravedad

del cuadro clínico y tipo de afección a ser tratada. Se recomienda hasta dos aplicaciones consecutivas. En las patologías crónicas de los perros pueden ser necesarios tratamientos prolongados por un periodo de hasta 28 días o a criterio del médico veterinario. En estos

casos se recomienda la continuidad del tratamiento con **Meloxifin (Comprimidos 0,5 mg)** o **Meloxifin (Comprimidos 2 mg)**.

Interacciones medicamentosas:

No administrar juntamente con otros antiinflamatorios esteroides o no esteroides o tras el uso de esas drogas. Se recomienda un período de 24 horas de intervalo entre un tratamiento y otro, o de acuerdo con la farmacocinética de la droga anteriormente utilizada. No administrar juntamente con antibióticos del grupo de los aminoglucósidos (estreptomina, neomicina, gentamicina y kanamicina). No administrar juntamente con agentes anticoagulantes como la warfarina y la aspirina.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar en animales con disturbios cardíacos, hepáticos o renales severos. No administrar en animales con posible ulceración gastrointestinal o que presentaren evidencia de desórdenes hemorrágicos o hipersensibilidad al producto. Evitar la administración en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos en razón del riesgo de toxicidad renal ser potencializado. La seguridad del medicamento no fue establecida en perras preñadas.

Precauciones:

Obedecer la dosis y vías de administración indicadas para el uso del producto utilizando normas de asepsia propias para aplicación parenteral. El tratamiento de animales ancianos o con menos de 06 semanas de edad debe ser cuidadosamente acompañado por el médico veterinario, siendo en algunos casos, necesario reducir la dosis a ser administrada.

Reacciones adversas:

Pueden ocurrir reacciones generales como disminución del apetite, vómito, diarrea, melena y apatía. Estas reacciones son generalmente transitorias y tienden a desaparecer con la interrupción o fin del tratamiento.

Informaciones para uso médico:

El Meloxicam es un antiinflamatorio no esteroide de la familia de los oxicanos y no posee antídoto específico. En caso de intoxicaciones, realizar tratamiento sintomático.

Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.

**Consulte al médico veterinario.
Su venta requiere receta médica.**

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Registros: México: Reg. Q-7750-080 – Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil



Mientras cuidamos de la salud animal, reimaginamos el planeta. Accede reimagina.ourofino.com y conozca nuestras iniciativas para garantizar el equilibrio sostenible de la salud animal y el bienestar del mundo.



ourofino
salud animal