Moxi Duo

Uso Veterinario

Antiparasitario de amplio espectro con vitamina E

Q-7750-109

Fórmula:

Cada jeringa con 9.6 g	contiene:
Moxidectina	. 0,240 g
Praziquantel	1,490 g
Vitamina E (acetato)	. 0,600 g
Vehículo c.s.p	9,600 g

Indicaciones de Uso:

Moxi Duo es un antiparasitario de amplio espectro con vitamina E indicado en el control de los siguientes parásitos internos de los equinos: Habronema muscae, Trichostrongylus axei, Oxyuris equi, Strongylus edentatus, Triodontophorus serratus, Probstmayria vivipara, Cyathostominae y Anoplocephala perfoliata.

Modo de Uso:

Moxi Duo debe administrarse exclusivamente en equinos por la vía oral. Aplicar sobre la lengua del animal y en el fondo de la boca, la cual debe estar libre de comida. Después de la administración, mantenga la cabeza del animal en alto durante unos segundos.

Dosis:

Administrar a la dosis de 1,6 g por cada 100 kg de peso, obedeciendo la graduación que aparece en el émbolo de la jeringa (dosis equivalente a 0,4 mg de moxidectina, 2,48 mg de praziquantel y 1 mg de vitamina E por kilo de peso vivo).

Las dosis están graduadas a:
100 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg y 600 kg.

La jeringa completa es suficiente para tratar 600 kg de peso corporal.

Generalmente, el tratamiento con una sola dosis es suficiente para reducir la infestación, pero las prácticas de manejo existentes en cada propiedad, tales como: tipo de instalaciones, densidad animal, sexo, características genéticas o raciales, pueden influir en la incidencia de los parásitos. Por lo anterior, cada propiedad puede tener diferentes necesidades de control parasitario, por lo que se recomienda un control integrado y estratégico, a definir por el médico veterinario.

Contraindicaciones y Limitaciones de Uso:

No utilizar en animales que presentan hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.

No administrar en potros menores de 6 meses de edad. No administrar el producto en animales destinados para

No utilizar el producto con fecha de validez vencida.

Precauciones:

No utilizar el producto en condiciones distintas a las indicadas en el prospecto. Solo el médico veterinario puede realizar cambios en las dosis del producto.

No se han realizado estudios de seguridad en animales preñados. Cuando se manipule el producto, utilizar los equipos de protección individual

En caso de ingestión accidental, no inducir vómito y consultar inmediatamente al médico.

Interacciones Medicamentosas:

No mezclar con otros productos.

No administrar moxidectina con
medicamentos como ketoconazol,
itraconazol, ciclosporina y
bloqueadores de los canales de
calcio.

El uso concomitante con dexametasona reduce la eficacia del praziquantel.

Reacciones Adversas:

Cuando el producto se utiliza en las dosis indicadas no causa reacciones adversas. Sin embargo, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad individual. En un estudio que utilizó hasta tres veces la dosis terapéutica recomendada, no se presentaron cambios en parámetros clínicos, hematológicos y/o bioquímicos. En caso de reacción, busque atención médica veterinaria inmediata.

Tiempo de Retiro:

No se administre a equinos destinados al consumo humano.

Modo de Conservación:

Conservar en el empaque original, en un lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol y a una temperatura entre 15°C y 30°C.

Una vez abierto, utilice el producto dentro de los 6 meses siguientes.

Los envases vacíos y los restos de producto deben ser desechados de acuerdo con la reglamentación nacional vigente. No contaminar ríos u otras fuentes de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. SU VENTA REQUIRE RECETA MÉDICA.

Importado y distribuido por: México: Ouro Fino de México S.A de C.V – Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México

Elaborado por: Ourofino Saúde Animal Ltda. Rod. Anhanguera SP 330, km 298 CEP: 14140 000 Cravinhos SP CNPJ: 57.624.462/0001-05

Tel/Fax: 55 16 3518 2025 www.ourofinosaudeanimal.com Hecho en Brasil



05937/0423 OF00