

Ourocur 22%

USO VETERINARIO

Fenbendazol 22%
REG Q-7750-114

FÓRMULA:

Cada g contiene:

Fenbendazol	0,22 g
Excipiente c.b.p.	1,00 g

INDICACIONES:

Ourocur 22%: Antihelmíntico de amplio espectro, de uso oral, mezclado en el alimento. Indicado en estadios larvarios y adultos de nematodos gastrointestinales y pulmonares; presenta actividad ovicida.

En Bovinos (productores de carne y leche) tiene eficacia contra: *Haemonchus contortus*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Bunostomum phlebotomum*, *Cooperia spp*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Oesophagostomum radiatum* y *Dictyocaulus viviparus*.

En Equinos actúa contra: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*, *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum*.

DOSIS:

Bovinos: Dosis general: 5 mg/kg de peso, (lo que corresponde a un sobre de Ourocur 22%, por un bovino de hasta 450 kg).

Para tratamiento de *Ostertagia ostertagi* 10 mg/kg de peso (que corresponde a 2 sobres de **Ourocur 22%**, por cada bovino de hasta 450 kg).

Equinos: Dosis general: 5-10 mg/kg de peso 1 vez al día por 5 días, (correspondientes a 1 y 2 sobres de **Ourocur 22%**, por un equino de aproximadamente 300 kg).

Para el tratamiento de larva migrante de estróngilos: 50 mg/kg de peso al día, por un periodo de 3 días, (lo que corresponde a 7 sobres de **Ourocur 22%** por día); o 10 mg/kg de peso por un periodo de 5 días, (2 sobres de **Ourocur 22%** por día).

Para tratamiento de estróngilos enquistados en la mucosa intestinal, se recomienda una dosis de 30 mg/kg (que correspondería a 4 sobres de **Ourocur 22%** por un equino de aproximadamente 300 kg).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral (mezclado en el alimento).

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más

de 30°C en un lugar seco.

- **Ourocur 22%** presenta un margen de seguridad muy amplio, sin efectos adversos. No produce efectos embriotóxicos ni teratogénicos, ni afecta la capacidad reproductiva de las yeguas o de los garafiones. Su administración durante la preñez es segura.

- Además, **Ourocur 22%** no tiene olor ni sabor por lo que es bien aceptado por los animales.

PERIODO DE RETIRO:

- El sacrificio de bovinos destinados a consumo humano debe esperar, por lo menos, 13 días posteriores a la última administración del producto.

- La leche producida por vacas tratadas con **Ourocur 22%**, puede consumirse debido a que cuenta con cero días de retiro.

- No utilizar **Ourocur 22%** en equinos destinados al consumo humano, debido a que no existe información sobre tiempos de retiro en esta especie.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

Su venta requiere receta médica.

HECHO EN MÉXICO PARA:

Ouro Fino de México S.A de C.V
Av. Real Acueducto No. 335, Int.
1204, Col. Real Acueducto, C.P.
45116, Zapopan, Jalisco, México