

Herbalvet T.A.

Uso Veterinario

Bactericida, fungicida, viricida y protozoaricida.

Fragancia herbal.

Solución concentrada.

10 mL hacen al menos 5 L

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Cloruro de Benzalconio 15,00 g

Vehículo c.s.p. . 100,00 mL

Indicaciones:

Herbalvet T.A. es indicado como desinfectante (bactericida, fungicida, viricida y protozoaricida) con propiedad tensoactiva biodegradable y no corrosiva, para clínicas veterinarias, hospitales veterinarios, perreras, gateras, limpieza y desinfección de pisos, paredes, salas de baño y corte de pelo, mesas de consulta y de cirugías e instrumentos quirúrgicos. El producto posee acción efectiva contra las siguientes bacterias: *Escherichia coli*, *Salmonella enteritidis*, *Staphylococcus aureus* y *Pseudomonas aeruginosa* y contra los siguientes hongos: *Aspergillus flavus*, *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus niger*. También actúa en la inactivación de quistes de *Giardia* spp y del distemper virus (moquillo).

Farmacodinámica:

La sustancia Cloruro de Benzalconio es clasificada como surfactante catiónico. Es un compuesto químico que disminuye la tensión superficial de una solución acuosa, facilitando su penetración en superficies húmedas; forma emulsiones con las secreciones sebáceas conteniendo micro bacterias, lo que facilita la remoción de suciedades y micro bacterias con el proceso de lavado; remueve del área contaminada las células epiteliales de descamación, manchas y grasas.

Dosis y Modo de uso:

Para una correcta desinfección puede ser necesaria la previa limpieza del ambiente, dependiendo del grado de suciedad. En estos casos proceder con la remoción mecánica seguida de limpieza con agua y jabón para después hacer la desinfección con el **Herbalvet T.A.**, después de la retirada de todo el residuo de jabón utilizado en el área de desinfección.

Herbalvet T.A. debe ser diluido en agua limpia, siguiendo las diluciones abajo:

Para acción bactericida o fungicida: la dosis indicada es de 1 mL del producto para 500 mL de agua (1:500), o sea, 10 mL en 5 litros de agua y aplicado o pulverizado en pisos, paredes, mesas, perreras y gateras.

Para láminas de corte de pelo e instrumentos quirúrgicos, lavar y enjuagar las piezas y dejarlas inmersas en la solución del producto durante 20 minutos. Retirar las piezas y secar totalmente. En el caso de cuchillas de corte de pelo, realizar una lubricación después del secado. No es necesario enjuague pues el producto no es corrosivo.

Diluciones menores pueden ser utilizadas para las indicaciones de inactivación de quistes de *Giardia* spp - diluir 1 mL del producto para 700 mL de agua (1:700), o sea, 10 mL en 7 litros de agua y para inactivación del distemper virus - diluir 1 mL del producto para 1 litro de agua (1:1000), o sea, 10 mL en 10

litros de agua.

Para los casos en que el objetivo sea la desinfección para más de una indicación prevista en este rotulado, se debe considerar la menor dilución entre las Indicaciones de interés.

Precauciones:

Obedecer el modo de uso y diluciones preconizadas. Evitar el contacto del producto con la piel y con los ojos, pues podrá causar irritación en el local. Si esto ocurrir, lavar con agua abundante por 15 minutos. Si la irritación persistir, busque auxilio médico, llevando el embalaje del producto.

No mezclar con otros productos.

No ingerir. En caso de ingestión accidental, no provocar vómito. Procure ayuda médica inmediata, llevando el embalaje del producto.

No aplicar sobre personas, alimentos y animales.

Utilizar EPI adecuado (gafas, guantes, máscara y ropa de protección, como botas y mandil de PVC) durante la manipulación y aplicación del producto. Producto tóxico para peces, no tirar en ríos, lagos y otros cursos de agua.

Los animales solo deben retornar a las instalaciones después que estas estuvieren totalmente secas.

No utilizar producto con el plazo de caducidad vencido.

No reutilizar embalajes vacíos.

Después de abierto, utilizar en 06 meses.

Tras la dilución de 1:500, utilizar el producto en hasta 24 horas.

Tras la dilución de 1:700, utilizar el producto inmediatamente.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No utilizar el producto puro, pues en contacto con la piel y mucosas del hombre y animales puede causar irritaciones.

No usar junto con jabones y detergentes, pues los mismos disminuyen la actividad del desinfectante.

Reacciones adversas:

El producto es seguro para aplicación en el ambiente, conforme indicaciones y modo de usar preconizados. Sin embargo, informes de literatura apuntan la ocurrencia de reacciones adversas, cuando en contacto directo con el hombre.

Hay posibilidad de reacciones alérgicas en individuos hipersensibles a los componentes del producto. En concentraciones más elevadas, leves a graves quemaduras causticas pueden ocurrir en los labios, lengua, boca, faringe, hipo faringe, esófago y estómago.

Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta médica.

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Importado y distribuido por:

México: Reg. Q-7750-076 - Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Guadalupe, #5134 Int. B, Colonia Jardines de Guadalupe - Zapopan, Jalisco, México
CP. 45030 - Tel.: (52) 01 33 3620-3812.

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Hecho en Brasil

